



การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี

กรณีได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน

- ลดอัตราการดูดซึมและทำให้สารเคมีเจือจางลง โดยให้ผู้ป่วยรับประทานนม หรือไข่ดิบ หรือดื่มน้ำเปล่าทันที แต่ในกรณีที่ผู้ได้รับสารเคมีกำลังชักหรือสลบ อย่าให้ดื่มอะไรทั้งสิ้น
- หากเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ต่าง หรือสารกัดกร่อน (มีกลิ่น) ห้ามทำให้อาเจียน เด็ดขาด
- หลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้นำผู้ที่ได้รับสารเคมีนำส่งโรงพยาบาลโดยทันที และนำฉลากสารเคมีไปด้วย

กรณีได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง

- ให้ล้างผิวหนังในบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากที่สุด เพื่อให้เจือจางและ ชับน้ำออก ถ้าสารเคมีหกตอเสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าออกก่อน ห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใด ๆ เกลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีทำให้แผลกว้างและเจ็บมากขึ้น

กรณีได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตา

- ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที ป้ายชี้ฝั่งป้ายตา แล้วรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม

- ให้ย้ายผู้ได้รับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของสารเคมี ไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ช่วยผายปอด หรือกระตุ้นการหายใจด้วยยาตามฉุนๆ